

# ungewollt schwanger

*Informationen zum Thema  
Schwangerschaftsabbruch*





# ungewollt schwanger

---

*Informationen zum Thema  
Schwangerschaftsabbruch*

Referat Frauen & Gleichstellung der Stadt Graz  
Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren

*Liebe Leserinnen und Leser,*

*alle Angaben in dieser Broschüre wurden sorgfältig erhoben und überprüft. Dennoch besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Denn viele AnbieterInnen wollten oder konnten keine Angabe zu ihren Angeboten machen. Zudem können sich die Preise und Angebote ändern.*

*Wir werden regelmäßig die Angaben aktualisieren.*

*Ergänzungen und Korrekturen sind willkommen! Bitte schicken Sie eine E-Mail an [frauen.gesundheit@fgz.co.at](mailto:frauen.gesundheit@fgz.co.at) oder rufen Sie an: Tel. 0316/83 79 98.*

# Inhaltsverzeichnis

---

Vorworte	4
Alles was Recht ist	6
Wann beginnt eine Schwangerschaft?	6
Innerhalb der ersten drei Monate	6
Nach dem dritten Monat	7
Junge Frauen unter 18	8
Frauen leben zyklisch	10
Wann kann frau schwanger werden?	11
Bin ich schwanger?	12
Ungewollt schwanger	14
„Ich dachte, die Welt stürzt ein“	16
Wie werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?	17
Was kostet ein Schwangerschaftsabbruch?	22
Nach einem Schwangerschaftsabbruch	24
Verhütungsmittel	27
Wie kann ich eine neuerliche Schwangerschaft verhüten?	27
Verhütung im Notfall: Pille danach und Spirale	28
Büchertipps	31
Nützliche Links	34
Adressen	36
Frauengesundheitszentren	36
Weitere Beratungsstellen	38
Wo werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?	45

# Vorworte

---

*Ein großer Schritt für Österreichs Frauen war die Einführung der Fristenregelung im Jahr 1975. Die Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs binnen der ersten drei Schwangerschaftsmonate war und ist ein frauenpolitischer Meilenstein. Nicht zuletzt deshalb, weil dadurch das Selbstbestimmungsrecht der Frau sichergestellt wird. Und es geht hier um Grundsätzliches. Denn das Selbstbestimmungsrecht ist ein Entscheidungsrecht. Das Recht, selbst über sich und den eigenen Körper zu entscheiden. Schauen wir uns um in Europa und in Österreich, so gelangen in regelmäßigen Abständen Strömungen an die Oberfläche, die Frauen dieses Recht auf ihren eigenen Körper nehmen wollen. Mit der Unterstellung der „leichtfertigen“ Handlung werden Frauen immer noch unter Zugzwang gestellt und es wird versucht, sie gesellschaftlich zu verurteilen. Das Vorgehen dieser Organisationen und Personen lehne ich entschieden ab. Denn es sind schwierige persönliche Lebensumstände, die zu solch einer Entscheidung führen. Frauen in Schwangerschaftskonflikten brauchen eine kompetente, sachliche Beratung und Hilfe. Die Broschüre „ungewollt schwanger“ gibt so eine Hilfestellung und bietet wichtige Informationen in kompakter und übersichtlicher Form. Gut, dass es diese Broschüre gibt!*

*Ihre*

*Martina Schröck*

*Bürgermeisterstellvertreterin und Frauenstadträtin  
Stadt Graz*

## Ungewollt schwanger – was nun?

*Für Beraterinnen in Frauengesundheitszentren gehört diese Frage zum Arbeitsalltag. Die Frauen, die sie stellen, sind unterschiedlich: jünger oder älter, kinderlos oder mit Kindern, in einer Partnerschaft oder Single, in Ausbildung, im Beruf stehend oder auf Stellensuche, mit mehr oder weniger Geld und Unterstützung durch FreundInnen und Familie ... Ob sie sich für die Fortsetzung der Schwangerschaft entscheiden oder dagegen – ihre Gründe sind vielfältig. Ihre Entscheidung verdient auf jeden Fall Respekt.*

*Die Fristenlösung ermöglicht Frauen, eine Schwangerschaft bis zum Ende des dritten Monats straffrei abbrechen zu lassen. Dies ist ihr Recht. Trotzdem erfahren viele Frauen Ablehnung, wenn sie einen Abbruch erwägen, und erhalten nur mit Schwierigkeiten Informationen darüber, wo, wie und zu welchen Preisen Abbrüche durchgeführt werden oder keine Informationen in ihrer Sprache. Qualitätsstandards fehlen überhaupt. Welche Folgen das für Frauen haben kann, zeigt die jetzige Schließung einer Wiener Ordination, in der Abbrüche durchgeführt wurden. Das Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren hat daher seine Broschüre aktualisiert und ins Netz gestellt: [www.fgz.co.at/Links.106.0.html](http://www.fgz.co.at/Links.106.0.html).*

*Das Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren hat daher diese Broschüre erstellt. Damit Frauen ihre eigenen Wege gehen können – und diese weniger steinig sind.*



Netzwerk österreichischer Frauengesundheitszentren

# Alles was Recht ist

---

*Frauen haben das Recht, sich eigenverantwortlich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Das österreichische Strafgesetzbuch legt den Rahmen dafür fest.*

### *Wann beginnt eine Schwangerschaft?*

Etwa eine Woche nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle kommt es zur Einnistung in der Gebärmutter der Frau (Nidation). Damit beginnt nach österreichischem Recht eine Schwangerschaft. Daher gelten auch erst nach diesem Zeitpunkt die rechtlichen Regelungen über den Schwangerschaftsabbruch.

### *Innerhalb der ersten drei Monate*

Innerhalb der ersten drei Kalendermonate einer Schwangerschaft ist laut § 97 Strafgesetzbuch unter bestimmten festgelegten Bedingungen ein Abbruch zulässig. Zuvor muss, wie bei jedem medizinischen Eingriff, eine ärztliche Beratung stattfinden. Der Eingriff muss von einer Ärztin oder einem Arzt vorgenommen werden und kann ambulant oder stationär erfolgen. Die schwangere Frau kann die Ärztin oder den Arzt wählen. ÄrztInnen sind aber nicht verpflichtet einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen oder dabei mitzuwirken – es sei denn, der Schwangerschaftsabbruch wäre lebensnotwendig.



### *Nach dem dritten Monat*

In Österreich ist ein Schwangerschaftsabbruch nach dem dritten Kalendermonat nur zulässig, wenn es medizinische Gründe dafür gibt, etwa wenn ernste Gefahr für die Gesundheit der Frau besteht, eine schwere Fehlbildung des Fötus zu erwarten ist oder ein Mädchen, wenn es schwanger wird, das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. In allen anderen Fällen, zum Beispiel aus sozialen Gründen oder nach einer Vergewaltigung, ist ein Schwangerschaftsabbruch nach dem dritten Monat unzulässig und daher strafbar.

Gelegentlich kommt es vor, dass eine Frau oder ein Mädchen eine ungewollte Schwangerschaft spät feststellt oder sich aus anderen Gründen erst nach dem dritten Monat zu einem Abbruch entscheiden kann. In diesen Fällen ist ein Abbruch in Österreich nicht mehr erlaubt. In manchen europäischen Ländern, etwa den Niederlanden, Großbritannien oder Schweden, ist ein so genannter Spätabbruch auch für Frauen aus anderen Ländern legal möglich. Es gibt Kliniken, die sich auf diese Behandlung spezialisiert haben. Eine Übersicht der Kliniken aus den Niederlanden finden Sie auf [www.abtreibung.at](http://www.abtreibung.at)

## Junge Frauen unter 18

*Laut Gesetz gelten Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr als ein-sichts- und urteilsfähig. Der Gesetzgeber geht also davon aus, dass Mädchen die Bedeutung und die Tragweite eines Schwangerschaftsabbruches erfassen (§ 146c Abs 1 und 2 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).*

*Ambulante Schwangerschaftsabbrüche*, also Abbrüche, die ÄrztInnen in ihrer Ordination oder in einem Ambulatorium durchführen: Junge Frauen ab 14 Jahren können alleine entscheiden und benötigen keine Zustimmung der Erziehungsbe-rechtigten.

### *Schwangerschaftsabbrüche in Krankenhäusern*

Das Krankenanstaltengesetz des jeweiligen Bundeslandes schreibt für operative Eingriffe eventuell die Zustimmung eines Elternteils vor. Falls die Eltern nicht erreichbar sind oder nicht in die Entscheidung einbezogen werden können, dürfen JugendrichterInnen die Zustimmung zum Schwangerschafts-abbruch geben. In den steirischen KAGes Spitälern benötigen junge Frauen unter 18 Jahren die Zustimmung eines Erziehungs-berechtigten.

### *Gesetzestext und Erläuterung*

[www.bodyaction.at/bodyaction\\_download/nationale\\_gesetze/neuregelung\\_der\\_einwilligung\\_von\\_minderjaehrigen\\_in\\_medizinische\\_behandlungen.pdf](http://www.bodyaction.at/bodyaction_download/nationale_gesetze/neuregelung_der_einwilligung_von_minderjaehrigen_in_medizinische_behandlungen.pdf)

Internationale Erfahrungen zeigen: Kompetente geschlechtergerechte Sexualpädagogik, leichter und kostenloser Zugang zu Verhütungsmitteln sowie unabhängige Beratungsstellen verringern die Zahl an ungewollten Schwangerschaften von Mädchen und Frauen.

# Frauen leben zyklisch

---

*Von der Pubertät bis zu den Wechseljahren erleben Frauen monatlich ihren Zyklus. Die Zykluslängen sowie Dauer und Stärke der Regelblutungen sind so unterschiedlich wie die Frauen selbst. Deshalb ist eine Zykluslänge von zum Beispiel 24 Tagen genauso normal wie eine Länge von 36 Tagen.*

Jede Zyklusphase beginnt mit der Regelblutung (Menstruation). Der 1. Tag der Regelblutung ist auch der 1. Zyklustag. Der letzte Zyklustag ist jener Tag vor der nächsten Regelblutung.

Während des Zyklus reifen im Eierstock unter Einfluss des Hormons FSH mehrere *Eibläschen* (Follikel) heran. Sie bilden dabei Hormone, nämlich Östrogene. Ein Eibläschen wird reifer als die anderen. Durch das Hormon LH löst sich die in diesem Bläschen enthaltene Eizelle. Dies ist der *Eisprung*. Die Eizelle wandert danach in den Eileiter.

Die Eihülle verbleibt im Eierstock. Aus ihr entwickelt sich der *Gelbkörper*, dessen Zellen das so genannte Gelbkörperhormon (Gestagen) bilden. Dieses sorgt dafür, dass die *Gebärmutter-schleimhaut* aufgebaut und verstärkt durchblutet wird. Hat keine Verschmelzung mit einer Samenzelle (Spermium) stattgefunden, löst sich die Eizelle auf, etwa wenn eine Frau keinen Geschlechtsverkehr gehabt oder erfolgreich verhütet hat. Die Gebärmutter-schleimhaut wird als *Regelblutung* ausgestoßen – ein neuer Zyklus beginnt.

# Wann kann frau schwanger werden?

*Frauen können schwanger werden in der **Zeit des Eisprungs**. Die Eizelle kann nur in einem Zeitraum von 24 Stunden mit einer Samenzelle verschmelzen.*

Wenn in dieser Zeit oder einige Tage vorher – Samenzellen bleiben bis zu 5 Tage aktiv! – ungeschützter Geschlechtsverkehr stattfindet und Samenzellen durch die Gebärmutter in die Eileiter gelangen, kann es dort zu einer Verschmelzung kommen.

Entgegen den bisherigen Annahmen liegen die fruchtbaren Tage nur bei 30 Prozent der Frauen (bei 30 von 100 Frauen) vollständig im Zeitraum zwischen dem 10. und dem 17. Zyklustag. 70 Prozent der Frauen (70 von 100 Frauen) haben mindestens einen Tag ihrer fruchtbaren Tage schon vor dem 10. oder auch noch nach dem 17. Tag (Wilcox et. al., 2000).

Eine mit einer Samenzelle verschmolzene Eizelle braucht weitere 5 bis 6 Tage, um durch den Eileiter die Gebärmutter zu erreichen und sich dort in der Gebärmutterschleimhaut einzunisten. Etwa eine Woche nach der Verschmelzung ist die Einnistung abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt rechtlich betrachtet die Schwangerschaft. In der Medizin wird das Alter einer Schwangerschaft jedoch immer beginnend mit dem 1. Tag der letzten Regelblutung berechnet.

### Bin ich schwanger?

*Viele Frauen wissen sehr früh, dass sie schwanger sind – die Regelblutung bleibt aus, es ist ihnen morgens übel, die Brüste spannen oder sie fühlen sich erschöpft und müde. Andere Frauen merken keine Anzeichen.*

Frauen, die einen unregelmäßigen Zyklus haben, können sich auch nicht am Kalender orientieren. Dies ist besonders häufig bei sehr jungen Frauen oder bei Frauen zu Beginn der Wechseljahre der Fall. Es kommt auch vor, dass Frauen trotz beginnender Schwangerschaft noch Blutungen haben, die aber meist schwächer als eine normale Regelblutung sind.

*Wenn Sie Anzeichen dieser Art bemerken und auch vermuten, dass Ihre Verhütung nicht zuverlässig gewesen sein könnte, sollten Sie möglichst bald einen Schwangerschaftstest machen. Je früher Sie wissen, dass Sie schwanger sind, umso mehr Zeit haben Sie für Überlegungen, Gespräche und um sich zu informieren.*

Schwangerschaftstest oder Ultraschalluntersuchung geben Frauen Gewissheit, ob sie schwanger sind oder nicht.

### *Schwangerschaftstest*

Die einfachste Art eine Schwangerschaft früh festzustellen ist, das Hormon hCG (Human Choriongonadotropin) im Harn (Urin) nachzuweisen. Es wird im Körper von Frauen fast nur während der Schwangerschaft gebildet und ist schon 10 Tage nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle im Harn feststellbar. ÄrztInnen, Ambulatorien und Frauengesundheitszentren bieten Tests an. Schwangerschaftstests sind auch ab 4€ in Drogeriemärkten und Apotheken erhältlich und können zu Hause durchgeführt werden.

*Wenn der Test keine Schwangerschaft anzeigt, kann das bedeuten, dass Sie nicht schwanger sind. Es kann aber auch sein, dass es zu früh für einen Test ist. Dann ist es sinnvoll, dass Sie nach einer Woche wieder testen. Wiederholen Sie auch dann den Test, wenn Ihre Regelblutung weiter ausbleibt. Wichtig ist, dass Sie in dieser Zeit verhüten. Denn während Zyklusunregelmäßigkeiten können Sie schwanger werden.*

### *Ultraschalluntersuchung*

Mittels Ultraschall kann etwa ab der 5. Schwangerschaftswoche der Fruchtsack festgestellt und damit das Alter der Schwangerschaft berechnet werden.

## Ungewollt schwanger

---

*Wenn Frauen merken, dass sie ungewollt schwanger sind, ist das oft ein Schock. Für manche Frauen schlägt die anfängliche Verwirrung rasch in Freude um. Manche Frauen stellen schnell fest, dass sie in ihrer momentanen Situation kein Kind haben wollen. Andere Frauen sind hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, das Kind zu bekommen, und dem Zweifel, ob es für sie derzeit möglich ist. Wenn der erste Schock weicht, beginnt die Suche nach einer Lösung. Bis zu einer Entscheidung kann es einige Zeit dauern.*

Viele Fragen kreisen im Kopf: Wie soll ich das alleine schaffen? – Was wird aus meiner Ausbildung, meinem Beruf? – Was wird mein Partner dazu sagen? – Ist unsere Beziehung stark genug für ein Kind? – Möchte ich überhaupt ein (weiteres) Kind? – Würde ich einen Schwangerschaftsabbruch verkraften? Innere Wünsche und äußere Umstände stehen häufig miteinander in Streit. Dazu kommt der Druck, innerhalb kurzer Zeit zu entscheiden.

Männer reagieren in dieser Situation nicht immer so, wie sich Frauen das wünschen. Manche Männer sind überfordert, ratlos, verantwortungslos oder fühlen sich schuldig, weil sie nicht besser „aufgepasst“ haben. Ist es möglich, kann es sehr hilfreich sein, die Gedanken und Gefühle miteinander zu teilen und gemeinsam eine Entscheidung zu treffen.



### *Seelische Folgen?*

Ein Schwangerschaftsabbruch umfasst viele verschiedene Erfahrungen. Frauen entscheiden sich aus sehr unterschiedlichen Gründen dafür, zu unterschiedlichen Zeiten ihrer Schwangerschaft und für verschiedene Methoden.

Frauen sind vielfältig. Wissenschaftliche Studien zeigen: Bei einer ungewollten Schwangerschaft ist das Risiko seelische Probleme zu bekommen für die Frauen, die sich zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheiden, gleich groß wie für jene, die die Schwangerschaft austragen.

[www.apa.org/releases/abortion-report.pdf](http://www.apa.org/releases/abortion-report.pdf)

*„Ich dachte, die Welt stürzt ein ...“*

*Die meisten Frauen, die ungewollt schwanger sind, erleichtert es, wenn sie über ihre Gefühle und Zweifel sprechen können. Suchen Sie jemanden, mit dem Sie reden können!*

*FreundInnen und Verwandte erweisen sich häufig als große Stütze. Viele Frauen haben schon einen oder mehrere Abbrüche durchführen lassen, aber bisher nicht darüber gesprochen. Vielleicht möchten Sie sich auch einer Frau anvertrauen, die schon ein Kind hat. Sie kann Ihnen von ihren Freuden und Problemen als Mutter erzählen. Wenn Sie mit unterschiedlichen Personen sprechen, erfahren Sie verschiedene Sichtweisen. Wichtig ist, dass Sie ihren GesprächspartnerInnen vertrauen können!*

*Es kann für Sie auch hilfreich sein, sich an eine unabhängige Beratungsstelle zu wenden (Adressen ab S. 35). Ein Gespräch mit einer einfühlsamen Beraterin bringt Ihnen wahrscheinlich mehr Klarheit. Was auch immer Sie aussprechen oder entscheiden, es ist in Ordnung. Die Beraterin wird Ihnen vielleicht noch Informationen geben oder Sichtweisen vor Augen führen, die Sie nicht bedacht haben. Sie kann Sie stärken – die Entscheidung treffen letztendlich Sie!*

# Wie werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?

*Nach Schwangerschaftsabbrüchen, die von erfahrenen ÄrztInnen und unter medizinisch einwandfreien Bedingungen durchgeführt werden, treten sehr selten Komplikationen auf. Manchen Frauen macht aber der medizinische Eingriff selbst Angst. Wer die verschiedenen Methoden und ihre Abläufe kennt, kann leichter eine Entscheidung treffen.*

### *Absaugmethode (Saugcurette)*

Sie ist die schonendste und sicherste Methode eines Schwangerschaftsabbruchs und ab der 5. Schwangerschaftswoche möglich. Allerdings führen manche ÄrztInnen sie nicht vor der 7. Woche durch.

### *Ablauf*

Nachdem die Schwangerschaft bestätigt und eine vaginale Untersuchung gemacht wurde, verabreicht die Anästhesistin oder der Anästhesist die wenige Minuten dauernde Vollnarkose oder die Ärztin oder der Arzt betäubt den Gebärmutterhalskanal örtlich. Der Gebärmutterhals wird festgehalten, danach wird dieser Kanal leicht gedehnt und mit einem Plastikröhrchen (Saugcurette) das Schwangerschaftsgewebe und die Schleimhaut aus der Gebärmutter abgesaugt. Anschließend wird mit Ultraschall eine Nachkontrolle durchgeführt, um sicherzugehen, dass keine Gewebereste zurückgeblieben sind.

### **+ Plus**

Dieser Eingriff ist für erfahrene ÄrztInnen einfach durchführbar. Er dauert nur wenige Minuten und ist unter Vollnarkose oder mit örtlicher Betäubung möglich. (Örtliche Betäubung ist in anderen Ländern Standard. In Österreich wird sie nur vereinzelt angeboten.)

### **- Minus**

Die Absaugmethode ist erst dann möglich, wenn ein Fruchtsack im Ultraschall sichtbar ist.

## **Mögliche unerwünschte Wirkungen**

### **Infektion**

Anzeichen dafür sind Körpertemperatur über 37,5 Grad, die mehr als 2 Tage anhält, sowie stärkere Blutungen und Krämpfe.

Behandlung: Bei diesen Symptomen sofort eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Infektionen, die frühzeitig erkannt werden, können schnell und sicher mit Antibiotika behandelt werden.

### **Starke Blutungen**

Eine Blutung nach dem Abbruch ist ganz normal und dauert meist ein bis zwei Wochen. Die Ursache für eine starke Blutung können Geweberückstände in der Gebärmutter sein.

Behandlung: Medikamente, eventuell ist eine Nachcurettage notwendig. Nach einem Abbruch mit der Absaugmethode kommt es in 2 bis 5 Prozent der Fälle (also bei 2 bis 5 von 100 Frauen) zu einem unvollständigen Abbruch.

### ***Verletzung der Gebärmutter***

Eine sehr seltene Komplikation. Sie wird normalerweise von den behandelnden ÄrztInnen sofort erkannt. Meist reicht ein Tag Beobachtung in einem Spital aus. Eventuell ist eine Operation notwendig.

### ***Curettage (Ausschabung)***

#### ***Ablauf***

Mit einer Kürette, einem kleinen löffelförmigen Instrument, wird unter Vollnarkose das Schwangerschaftsgewebe aus der Gebärmutter gelöst und entfernt.

#### ***- Minus***

Als Methode für einen Schwangerschaftsabbruch ist dieser Eingriff veraltet, da nach dem Eingriff unnötig starke Schmerzen auftreten können und er mit Risiken verbunden ist.

### ***Der medikamentöse Abbruch***

Seit Jänner 2000 ist das Medikament Mifegyne® in Österreich zugelassen – jedoch nur in Krankenanstalten und Ambulatorien, nicht aber, wie in den meisten anderen Ländern, bei niedergelassenen ÄrztInnen.

#### ***Ablauf***

Das Verfahren des Abbruchs dauert meist 3 Tage:

Am ersten Tag nehmen Frauen das erste Medikament, ein Hormon, in Form von 3 Tabletten ein (Mifepristone 600 mg, Handelsname: Mifegyne®). Damit beginnt der Prozess des Abbruchs.

Am dritten Tag wird ein weiteres Hormon, ein Prostaglandin (Misoprostol 400 µg, Handelsname: Cyprostol®) eingenommen. Kurze Zeit danach wird der Fruchtsack ausgestoßen, wobei es zu einer starken Blutung kommen kann. Im Normalfall jedoch ist eine Blutung ähnlich einer normalen Regelblutung zu erwarten. Ein bis zwei Wochen später wird eine medizinische Nachuntersuchung (Ultraschall) durchgeführt, um zu klären, ob die Schwangerschaft tatsächlich beendet wurde.

#### **+ Plus**

Ein medikamentöser Abbruch ist ab dem Zeitpunkt, an dem Frauen das positive Ergebnis eines Schwangerschaftstests erhalten, bis zur 9. Woche der Schwangerschaft (63 Tage gerechnet ab dem ersten Tag der letzten Regel) möglich. Er ist also früher anwendbar als die Absaugmethode.

#### **- Minus**

Der Prozess des Abbruchs dauert mehrere Tage. Frauen nehmen mehrere Medikamente ein. Der Fruchtabgang tritt zu Hause ein, er kann schmerzhaft sein.

#### **Mögliche unerwünschte Wirkungen**

Krampfartige Schmerzen sowie Übelkeit oder Durchfall können auftreten und Schmerzmittel nötig machen.

#### **Stärkere und längere Blutungen**

In etwa 1 Prozent (bei 1 von 100 Frauen) wird eine Nachbehandlung (Curettage) notwendig, weil der Abbruch unvollständig ist. Die Nachcurettage ist meist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden (je nach Institution unterschiedlich).

***Wann ist ein medikamentöser Abbruch nicht möglich?***

Bei Blutgerinnungsstörungen, bei Erkrankungen der Nebennieren, bei schwerem, nicht therapeutisch kontrolliertem Asthma, bei bereits festgestellter Eileiterschwangerschaft (extrauterine Schwangerschaft) und bei Herz-Kreislaufferkrankungen.

# Was kostet ein Schwangerschaftsabbruch?

Für diese Broschüre haben Mitarbeiterinnen der Frauengesundheitszentren und von FEMAIL – FrauenInformationszentrum Vorarlberg ÄrztInnen und Kliniken angerufen, um die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch zu erfragen. Die Antworten waren immer wieder ausweichend oder unvollständig. Vereinzelt wurde auch untersagt, den Preis zu veröffentlichen. Die angegebenen Preise reichen von 282€ bis 886€ (Mai 2013).

In Österreich muss jede Frau den Schwangerschaftsabbruch selbst zahlen, auch wenn sie über wenig Geld verfügt. Manchmal gibt es Kostenzuschüsse. Informationen dazu erhalten Sie in unabhängigen Beratungsstellen, etwa Frauengesundheitszentren (S. 36–37).

Erfragen Sie auch, was Sie mitbringen sollen.  
Das könnte etwa sein:

### *Checkliste Vorbereitung*

- Überweisung
- Schwangerschaftsnachweis (Ultraschallbild)
- Blutgruppenausweis
- Weitere Laboruntersuchungen
- Bestimmte Kleidung
- Binden (Vorlagen)
- ...



Die vollständige Liste von ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, steht unter [www.fgz.co.at/Links.106.0.html](http://www.fgz.co.at/Links.106.0.html) bereit.

Wenn Sie einen Schwangerschaftsabbruch planen, wollen Sie vermutlich Preise vergleichen. Fragen Sie dafür nach dem Ablauf und folgenden möglichen Kosten:

#### *Checkliste Kosten*

- Aufklärungsgespräch
- Voruntersuchung: gynäkologische Untersuchung mit Ultraschall, bakteriologische Untersuchung, Schwangerschaftstest (kann unter Umständen auch zu Hause gemacht werden)
- Rhesus Test und eventuell Partobulin-Spritze, falls eine Frau einen negativen Rhesusfaktor hat
- Schwangerschaftsabbruch: chirurgische oder medikamentöse Methode, in Vollnarkose oder mit lokaler Betäubung, Medikamente
- Nachuntersuchung
- Tagsatz (In manchen Spitälern werden zwei Tagsätze in Rechnung gestellt. Frauen, die keine Beschwerden haben, können einen Revers unterschreiben und früher das Spital verlassen.)

## Nach einem Schwangerschaftsabbruch

### ***Gönnen Sie sich Ruhe***

*Nach einem Schwangerschaftsabbruch ist aus medizinischer Sicht keine Bettruhe erforderlich. Durch die einsetzende Hormonumstellung könnte es aber sein, dass Sie sich körperlich oder seelisch erschöpft fühlen. Nach zwei Tagen können Sie alles tun – solange Sie das Gefühl haben, es tut Ihnen gut.*

### *Erleichtert und vielleicht auch traurig*

Das Ende einer ungewollten Schwangerschaft kann eine Erleichterung bedeuten. Ängste sind überwunden und Frau hat ihr Leben in die eigene Hand genommen – diese Gefühle lassen die meisten Frauen erst einmal befreit aufatmen.

Es gilt aber auch Abschied von der Schwangerschaft zu nehmen. Damit kann ein Gefühl von Trauer verbunden sein. Dies kann auch erst später auftreten. Manche Frauen empfinden Schuldgefühle.

Für die Verarbeitung danach ist die Zeit davor besonders von Bedeutung. Frauen, die sich mit ihren widersprüchlichen Gefühlen zur ungewollten Schwangerschaft auseinandergesetzt haben und sich selbstbestimmt entscheiden konnten, fühlen sich danach befreit. Andere, für die dies schwierig war, können auch die unterschiedlichen Gefühle nachher schwerer

annehmen. Natürlich ist es auch in dieser Phase möglich, eine Beratungsstelle aufzusuchen, um die Entscheidung mit professioneller Hilfe aufzuarbeiten.

Manchmal bedeutet ein Schwangerschaftsabbruch auch das Ende einer Partnerschaft. Frauen müssen sich dann neu orientieren, das Alleinsein bewältigen und die Enttäuschung verarbeiten. Es kann aber auch gelingen, dass eine gemeinsame Entscheidung die Beziehung stärkt. Einige Frauen haben eine Zeitlang keine Lust auf Geschlechtsverkehr oder sogar Angst davor. Sie brauchen Zeit und Verständnis, bis das Vertrauen zur Verhütung oder auch zum Partner wieder aufgebaut ist.

### *Mögliche körperliche Folgen*

Tests können noch mehrere Wochen eine Schwangerschaft anzeigen, da das Hormon hCG nur langsam aus dem Körper ausgeschieden wird. Fragen, Unklarheiten oder Beschwerden sollten Frauen am besten direkt mit den behandelnden ÄrztInnen besprechen.

#### *Blutungen*

Nach einem Abbruch tritt eine Blutung auf, die meistens nicht stärker als eine durchschnittliche Regelblutung ist. Die Dauer ist unterschiedlich lang. Die Blutung kann nach einem chirurgischen Eingriff am 2. oder 3. Tag nach dem Abbruch stärker sein als am Tag des Abbruchs selbst, kann auch aussetzen und nach ein paar Tagen wieder beginnen. Die meisten Frauen haben 1 bis 2 Wochen nach dem Abbruch Blutungen und danach kurze Zeit noch leichte Schmierblutungen.

### *Krämpfe*

Krämpfe direkt nach einer Absaugung treten nur vereinzelt auf, sind aber meist nicht stärker als bei einer normalen Regelblutung. Ein krampflösendes Schmerzmittel kann helfen. Frauen, bei denen später Krämpfe auftreten, sollten unbedingt ihre Ärztin oder ihren Arzt kontaktieren.

### *Infektion*

Um einer möglichen Infektion vorzubeugen, sollten zwei Tage lang folgende Punkte beachtet werden:

- Nicht baden oder schwimmen. Duschen ist möglich.
- Keine Fremdkörper in die Scheide einführen.
- Kein vaginaler Geschlechtsverkehr. Andere sexuelle Aktivitäten sind, wenn gewünscht, unbedenklich.
- Während der Blutung nur Binden benutzen, keine Tampons.

### *Buchtipp*

Traurig und befreit zugleich – Frauen berichten  
[www.abtreibung.at/pages/Traurig+befreit.html](http://www.abtreibung.at/pages/Traurig+befreit.html)

## Verhütungsmittel

---

*Wie kann ich eine neuerliche Schwangerschaft vermeiden?*

***Nach einem Schwangerschaftsabbruch können Sie sofort wieder schwanger werden.*** Es ist daher klug, sich Gedanken darüber zu machen, welche Verhütungsmethode nun für Sie passt. Hilfreich sind Gespräche mit Freundinnen, aber auch Beratung durch FrauenärztInnen und in Beratungsstellen. Vielleicht möchten Sie sich auch mit Ihrem Partner besprechen – Frauen werden nicht alleine schwanger.

*Broschüren und Bücher zu diesem Thema finden Sie auf S. 31, weitere Information und Links auf der Website [www.fgz.co.at/Verhuetung.197.0.html](http://www.fgz.co.at/Verhuetung.197.0.html) und unter [www.verhuetung.info](http://www.verhuetung.info)*

Alle Verhütungsmittel, wie auch eine Sterilisation für Frauen sowie Männer, werden in Österreich nicht von der Krankenkasse übernommen, sondern müssen selbst bezahlt werden.

# Verhütung im Notfall

*Notfallverhütung kann eine Schwangerschaft kurz nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr verhindern – etwa wenn das Kondom geplatzt oder verrutscht ist oder die Pille vergessen wurde, oder wenn eine Frau erzwungenen Sex hatte. Möglich ist dies durch das Medikament Pille danach oder das Einsetzen einer Kupferspirale.*

### *Pille danach mit Levonorgestrel*

Am Markt ist ein rezeptfreies Präparat mit dem Inhaltsstoff Levonorgestrel. Diese Pille danach heißt Vikela<sup>®</sup>. Eine zweite Pille danach mit dem gleichen Inhalt, Postinor<sup>®</sup> ist nur mit Rezept erhältlich.

#### *Wann*

Die Tablette muss so rasch wie möglich nach dem ungeschützten Verkehr, spätestens jedoch 72 Stunden danach, das sind 3 Tage, eingenommen werden. Die Pille danach wirkt umso sicherer, je früher sie eingenommen wird. In den ersten 12 Stunden ist die Wirksamkeit am höchsten.

#### *Wirkung*

Die Wirksamkeit im Einzelnen (laut pro familia Deutschland):  
1. Tag ca. 95 Prozent, das heißt von 100 erwarteten Schwangerschaften werden 95 verhindert, 2. Tag ca. 85 Prozent, 3. Tag ca. 60 Prozent.

Die Pille danach kann zu jedem Zeitpunkt im Zyklus eingenommen werden, unabhängig von den Mahlzeiten.

Durch das Hormon Gestagen wird der Eisprung im Eierstock verhindert oder verzögert. Dadurch ist kein Ei reif, das mit einer Samenzelle verschmelzen könnte. Es kommt zu keiner Schwangerschaft.

Allerdings wirkt die Pille danach nur einmal im Zyklus. Hat eine Frau nach Einnahme der Pille danach Geschlechtsverkehr, müssen sie und ihr Partner mit Kondom verhüten. Die Pille danach eignet sich nicht für eine regelmäßige Verhütung. Die Pille danach bewirkt keinen Schwangerschaftsabbruch: Sie wirkt nicht mehr, wenn sich bereits eine mit einer Samenzelle verschmolzene Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat, die Frau also bereits vor der Einnahme schwanger war. Die Pille danach bietet auch keinen Schutz vor einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten.

### *Eileiterschwangerschaft*

Fühlt sich eine Frau trotz Einnahme der Pille danach schwanger oder ist eine Schwangerschaft nachzuweisen, ist es wichtig abzuklären, ob eine Eileiterschwangerschaft vorliegt.

### *Unerwünschte Wirkungen*

25 Prozent, also 25 von 100 Frauen, erleben Übelkeit nach der Einnahme. Manche Frauen erbrechen sich. Wenn dies innerhalb von drei Stunden nach der Einnahme erfolgt, muss erneut eine Pille danach eingenommen werden.

Gelegentlich kommen Kopfschmerzen, Schwindel, Brustspan-

nen oder Müdigkeit vor. Häufig gibt es Zwischenblutungen in den Tagen nach der Einnahme. Die nächste Regelblutung kann etwas früher oder etwas später als erwartet eintreten. Es gibt keine schwerwiegenden medizinischen Gründe, die gegen eine Einnahme sprechen. Aus diesem Grund ist die Pille danach, Vikela®, nicht rezeptpflichtig.

### *Wo*

Frauen aller Alterstufen können Vikela® in Österreich rezeptfrei in Apotheken kaufen. Das Medikament kostet 11,90€. Es kann sinnvoll sein, eine Packung auf Vorrat zu kaufen, um sie im Notfall zur Verfügung zu haben.

## *Pille Danach mit Ulipristalacetat*

Für Frauen ab 18 Jahren ist seit 1. Jänner 2010 eine weitere Pille danach mit dem Wirkstoff Ulipristalacetat, 30 mg, auf dem Markt: EllaOne®.

### *Wann*

Sie verhindert eine Schwangerschaft bis 120 Stunden (5 Tage) nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr – etwa wenn das Kondom geplatzt oder verrutscht ist oder die Pille vergessen wurde oder wenn eine Frau erzwungenen Sex hatte. Eine Frau sollte diese Pille danach nur einnehmen, wenn sie sicher ist, dass sie nicht schon vor diesem ungeschützten Geschlechtsverkehr schwanger war.

Diese Pille danach kann zu jedem Zeitpunkt im Zyklus eingenommen werden, unabhängig von den Mahlzeiten.



Wenn einer Frau innerhalb von 3 Stunden nach der Einnahme übel ist und sie erbricht, sollte sie eine weitere Tablette einnehmen.

### *Wirkung*

Die Substanz Ulipristalacetat setzt an den Progesteronrezeptoren an, so dass das Sexualhormon Progesteron nicht wirken kann. Progesteron ist dafür zuständig, dass sich Eiweißstoffe bilden, die für den Zeitpunkt des Eisprungs und für die Bildung der Gebärmutterschleimhaut eine Rolle spielen. Dadurch stört dieser Wirkstoff den Eisprung und kann auch Veränderungen der Gebärmutterschleimhaut bewirken. Es gibt Hinweise, dass dieser Wirkstoff eine abtreibende Wirkung haben kann.

Nach einer Studie wurden nach der Einnahme dieser Pille danach 60 Prozent, also 60 von 100, der erwarteten Schwangerschaften verhindert (arzneitelegramm 11/2009).

Bei 80 Prozent, also 80 von 100 Frauen, erfolgt nach einer Einnahme die nächste Regelblutung innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen vor und 7 Tagen nach dem erwarteten Zeitpunkt der nächsten Regelblutung.

### *Eileiterschwangerschaft*

Fühlt sich eine Frau trotz Einnahme der Pille danach schwanger oder ist eine Schwangerschaft nachzuweisen, ist es wichtig abzuklären, ob eine Eileiterschwangerschaft vorliegt.

### *Unerwünschte Wirkungen*

Die unerwünschten Wirkungen sind vergleichbar mit denen der Levonorgestrel haltigen Pille danach. 10 Prozent, also 10 von 100 Frauen, können Bauchschmerzen und Veränderun-

gen der Regelblutung haben. Zwischen 1 bis 10 Prozent der Frauen, erleben Übelkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Schwindel.

An jungen Frauen unter 18 Jahren ist diese Pille nicht geprüft. Sie ist daher für diese Altersgruppe nicht zugelassen.

Es liegen laut arzneitelegramm 11/2009 nur unzureichende Sicherheitsdaten vor.

### *Wo*

In Österreich ist diese Pille danach nur auf Rezept erhältlich. Dieses Medikament kostet 36,90€, und damit das Dreifache der Levonorgestrel haltigen Pille danach.

Die Pille danach ist rechtlich kein Schwangerschaftsabbruch. Sie sollte nicht verwechselt werden mit dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch mit Mifegyne®. Bei diesem wird eine bereits bestehende Schwangerschaft abgebrochen.

Mit der Pille danach hingegen wird das Entstehen einer Schwangerschaft nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr verhindert.

[www.fgz.co.at/Links.199.0.html#content1113](http://www.fgz.co.at/Links.199.0.html#content1113)

## *Mechanisch mittels Spirale*

Auch eine Kupferspirale verhindert, dass sich eine verschmolzene Eizelle in der Gebärmutter einnistet. Frauen können sie durch eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt innerhalb von fünf Tagen nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr einsetzen lassen.

Durch die Reizung der Gebärmutterschleimhaut kann es zu einer leichten Schmierblutung kommen.

## 5. KAPITEL

# Büchertipps

---

Boston Women's Health Book Collective: Unser Körper – unser Leben. Ein Handbuch von Frauen für Frauen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TB, 2000.

Czerwinski, Claudia; Sottong, Ursula (Hrsg): Kinder kriegt man zusammen - keine auch. Sexualität, Empfängnis, Familienplanung. München: Beck'sche Reihe, 2001.

Diehl, Sarah (Hrsg): Deproduktion. Schwangerschaftsabbruch im internationalen Kontext. Aschaffenburg: Alibri-Verlag, 2007.

Entscheiden Sie sich richtig ... bei Liebe, Sexualität und Verhütung. Broschüre des Wiener Programms für Frauengesundheit, 2007. Kostenlos zu bestellen: Broschürentelefon des Fonds Soziales Wien unter Tel: 05 05 379 -100 oder zum Downloaden: [www.verhuetung.info](http://www.verhuetung.info)

frauen leben. Studie zu Lebensläufen und Familienplanung. Kurzfassung. Hrsg.: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Köln 2000. Bestellung der kostenlosen Broschüre: [order@bzga.de](mailto:order@bzga.de)

Groth, Sylvia: Schwangerschaftsabbruch in Österreich. In: Beckermann, Maria J.; Perl, Friderike M.: Frauen-Heilkunde und Geburts-Hilfe. Basel: Schwabe, 2004, S. 916-919.

Hatcher, Robert A. u.a.: Contraceptive Technology, 2007, [www.contraceptivetechnology.com](http://www.contraceptivetechnology.com) (Das medizinische Standardwerk zu Verhütung)

Klein, Debby; Kaufmann, Tara: Schwanger – was nun? Entscheidungshilfen für den persönlichen Weg. München: Kösel, 1999.

Knopf, Marina; Mayer, Elfie; Meyer, Elsbeth: Traurig und befreit zugleich. Psychische Folgen des Schwangerschaftsabbruchs. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt TB, 2000. (Vergriffen, als PDF verfügbar: [www.abtreibung.at/pages/Traurig+befreit.html](http://www.abtreibung.at/pages/Traurig+befreit.html))

Langsdorff, Maja: Kleiner Eingriff – großes Trauma? Schwangerschaftskonflikte, Abtreibung und die seelischen Folgen. Norderstadt: Books on Demand, 2000.

Lindner, Rupert (Hrsg.): Liebe, Schwangerschaft, Konflikt und Lösung. Erkundungen zur Psychodynamik des Schwangerschaftskonflikts. Heidelberg: Mattes, 2008.

Lunneborg, Patricia: Jetzt kein Kind. Warum Abtreibung eine positive Entscheidung sein kann. Weinheim: Beltz TB, 2002.

Meyer, Elsbeth; Paczensky, Susanne von; Sadrozinski, Renate: Das hätte nicht noch mal passieren dürfen! Wiederholte Schwangerschaftsabbrüche und was dahintersteckt. Frankfurt/Main: Fischer TB, 1991.

NAF Textbook: A Clinician's Guide to Medical and Surgical Abortion. (Dies ist das einzige Fachbuch zum Schwangerschaftsabbruch. Das Buch ist derzeit vergriffen, aber eine Neuauflage

ist in Arbeit. Die wichtigsten Kapitel können als PDF heruntergeladen werden: [www.prochoice.org/education/resources/textbook.html](http://www.prochoice.org/education/resources/textbook.html))

Prävention von Schwangerschaften bei Minderjährigen. Hrsg.: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Köln 2007. Bestellung des kostenlosen Informationspakets zu Erkenntnissen, Fakten und Maßnahmen: [order@bzga.de](mailto:order@bzga.de)

Sichergehn. Verhütung für sie und ihn. Hrsg.: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Köln 2008. Bestellung der kostenlosen Broschüre: [order@bzga.de](mailto:order@bzga.de)

Wilcox, Allen J; David Dunson, Donna Day Baird: The timing of the "fertile window" in the menstrual cycle: day specific estimates from a prospective study. *British Medical Journal* 2000, 321, 1259-1262.

## Nützliche Links

---

### *Schwangerschaftsabbruch*

[www.abtreibung.at](http://www.abtreibung.at)

[www.gynmed.at](http://www.gynmed.at)

[www.abtreibung-web.de](http://www.abtreibung-web.de) (Schwangerschaftsabbruch in Deutschland)

[www.svss-uspda.ch](http://www.svss-uspda.ch) (Schweizerische Vereinigung für das Recht auf freie Entscheidung)

[www.stisan.nl](http://www.stisan.nl) (Kliniken in den Niederlanden, niederländisch)

[www.rutgersstimezoned.nl/Dindex.htm](http://www.rutgersstimezoned.nl/Dindex.htm) (Kliniken in den Niederlanden, deutsch)

[www.fiapac.org](http://www.fiapac.org) (Internationale Vereinigung von Fachkräften und Verbänden zu Schwangerschaftsabbruch und Kontrazeption)

[www.abortionfilms.org](http://www.abortionfilms.org) (Filme zum Thema Abbruch)

### *Verhütung*

[www.verhuetung.info](http://www.verhuetung.info)

[www.oegf.at](http://www.oegf.at) (Österreichische Gesellschaft für Familienplanung)

[www.netdokter.at](http://www.netdokter.at)

[www.profamilia.de](http://www.profamilia.de) (deutsche Online-Plattform für selbstbestimmte Sexualität)

[www.kessel-marketing.de](http://www.kessel-marketing.de) (Versand von Kondomen, Diaphragmen, Muttermundkappen zur Verhütung und Unterrichtsbehelfen für Sexualerziehung)

*Verhütung im Notfall*

[www.pille-danach.at](http://www.pille-danach.at)

*Mehrsprachige Materialien zu Schwangerschaftsabbruch und Verhütung*

[www.profamilia.de/shop/index.php?cmd=artlist&q=21](http://www.profamilia.de/shop/index.php?cmd=artlist&q=21)

*Informationen für junge Frauen und Männer*

[www.loveline.de](http://www.loveline.de)

[www.frauenarztbesuch.de](http://www.frauenarztbesuch.de)

[www.bravo.de](http://www.bravo.de)

*Information für Frauen mit körperlicher Behinderung*

[www.cebeef.com](http://www.cebeef.com)



## Adressen

---

### Frauengesundheitszentren

**Frauengesundheitszentrum**

Joanneumring 3/1, 8010 Graz

Tel.: 0316/83 79 98

E-Mail: [frauen.gesundheit@fgz.co.at](mailto:frauen.gesundheit@fgz.co.at)

[www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at)

**Frauengesundheitszentrum F.E.M.**

(Frauen Eltern Mädchen)

an der Semmelweis Frauenklinik

Bastiengasse 36-38, 1180 Wien

Tel.: 01/47 615-5771

Fax: 01/47 615-5779

E-Mail: [fem@aon.at](mailto:fem@aon.at)

[www.fem.at](http://www.fem.at)

**Frauengesundheitszentrum F.E.M. Süd**

im Kaiser Franz Josef-Spital

Kundratstraße 3, 1100 Wien

Tel.: 01/60 191-5201

Fax.: 01/60 191-5209

E-Mail: [femsued.post@wienkav.at](mailto:femsued.post@wienkav.at)

[www.fem.at](http://www.fem.at)

### **Frauengesundheitszentrum ISIS**

Alpenstraße 48 (Zentrum Herrnau), 5020 Salzburg

Tel.: 0662/44 22 55

Fax: 0662/44 22 55-50

E-Mail: [office@fgz-isis.at](mailto:office@fgz-isis.at)

[www.frauengesundheitszentrum-isis.at](http://www.frauengesundheitszentrum-isis.at)

### **Frauengesundheitszentrum Kärnten GmbH**

Völkendorfer Straße 23, 9500 Villach

Tel.: 04242/53 055

Fax: 04242/53 055-15

E-Mail: [fgz.sekretariat@fgz-kaernten.at](mailto:fgz.sekretariat@fgz-kaernten.at)

[www.fgz-kaernten.at](http://www.fgz-kaernten.at)

### **Linzer Frauengesundheitszentrum**

Kaplanhofstraße 1, 4020 Linz

Tel.: 0732/77 44 60

Fax: 0732/77 44 60-60

E-Mail: [office@fgz-linz.at](mailto:office@fgz-linz.at)

[www.fgz-linz.at](http://www.fgz-linz.at)

### **Frauengesundheitszentrum Wels**

Kaiser-Josef-Platz 52/1, 4600 Wels

Tel.: 07242/35 16 86-18 oder -19

Mobil: 0699/19 12 12 19

Fax: 07242/35 16 86-22

E-Mail: [fgz-wels@pga.at](mailto:fgz-wels@pga.at)

[www.fgz.at](http://www.fgz.at)

### Weitere Beratungsstellen

Eine Liste mit allen Angaben wie Beratungsangebot, Kosten sowie Warte- und Öffnungszeiten, finden Sie unter [www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at) und [www.doku.at](http://www.doku.at). Sie können sie auch in einem österreichischen Frauengesundheitszentrum (S. 36, 37) anfordern. Oder Sie erfragen die unterschiedlichen Angebote telefonisch direkt bei den Beratungsstellen, bevor Sie sich entscheiden.

#### *Beratungstellen im Burgenland*

##### **Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Oberwart**

Prinz Eugen-Straße 12, 7400 Oberwart

Tel.: 03352/33 855

E-Mail: [info@frauenberatung-oberwart.at](mailto:info@frauenberatung-oberwart.at)

[www.frauenberatungsuebgbld.at](http://www.frauenberatungsuebgbld.at)

##### **Frauen-, Mädchen- und Familienberatungsstelle Güssing**

Marktplatz 9/4, 7540 Güssing

Tel.: 03322/43 001

E-Mail: [info@frauenberatung-guessing.at](mailto:info@frauenberatung-guessing.at)

[www.frauenberatungsuebgbld.at](http://www.frauenberatungsuebgbld.at)

**Frauen- und Mädchenberatung Jennersdorf**  
in der Bezirkshauptmannschaft, Hauptplatz 15,  
8380 Jennersdorf  
Tel.: 03329/45 202-4746  
Mobil: 0664/15 91 373  
E-Mail: [frauenberatung-je@gmx.at](mailto:frauenberatung-je@gmx.at)  
[www.frauenberatungsuebglld.at](http://www.frauenberatungsuebglld.at)

## *Beratungsstellen in Kärnten*

### **Frauenberatung Belladonna**

Villacher Ring 21/2, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/51 12 48

E-Mail: [frauenberatung.belladonna@aon.at](mailto:frauenberatung.belladonna@aon.at)

[www.frauenberatung-belladonna.sid.at](http://www.frauenberatung-belladonna.sid.at)

### **Frauenberatung Villach**

Peraustraße 23, 9500 Villach

Tel.: 04242/24 609

E-Mail: [info@frauenberatung-villach.at](mailto:info@frauenberatung-villach.at)

[www.frauenberatung-villach.at](http://www.frauenberatung-villach.at)

### **Frauenservice und Familienberatungsstelle Wolfsberg**

Johann-Offner-Straße 1, 9400 Wolfsberg

Tel.: 04352/52 619

E-Mail: [office@fraueninfo.at](mailto:office@fraueninfo.at)

[www.fraueninfo.at](http://www.fraueninfo.at)

### **WIFF – Frauen- und Familienberatung**

Herzog-Bernhard-Platz 13/2, 9100 Völkermarkt

Tel.: 04232/47 50

Mobil: 0676/69 43 319

E-Mail: [wiff.vk@aon.at](mailto:wiff.vk@aon.at)

[www.wiff-vk.at](http://www.wiff-vk.at)

## *Beratungsstellen in der Salzburg*

### **Frauengesundheitszentrum ISIS**

Alpenstraße 48 (Zentrum Herrnau), 5020 Salzburg

Tel.: 0662/44 22 55

E-Mail: [office@fgz-isis.at](mailto:office@fgz-isis.at)

[www.frauengesundheitszentrum-isis.at](http://www.frauengesundheitszentrum-isis.at)

### **Sexualberatungsstelle**

Platzl 2, 5020 Salzburg

Tel.: 0662/87 08 70

E-Mail: [mail@sexualberatung-salzburg.at](mailto:mail@sexualberatung-salzburg.at)

[www.sexualberatung-salzburg.at](http://www.sexualberatung-salzburg.at)

### **Verein Frauentreffpunkt**

Paris-Lodron-Straße 32, 5020 Salzburg

Tel.: 0662/87 54 98

E-Mail: [office@frauentreffpunkt.at](mailto:office@frauentreffpunkt.at)

[www.frauentreffpunkt.at](http://www.frauentreffpunkt.at)

### **Familienberatungsstelle der Caritas**

Elisabethstraße 47, 5020 Salzburg

Tel.: 0662/43 46 33

E-Mail: [familienberatung@caritas-salzburg.at](mailto:familienberatung@caritas-salzburg.at)

[www.caritas-salzburg.at](http://www.caritas-salzburg.at)

### **Familienberatungsstelle KOKO**

Ignaz-Harrer-Straße 38, 5020 Salzburg

Tel.: 0662/43 63 69-30

E-Mail: [office@koko.at](mailto:office@koko.at)

[www.koko.at](http://www.koko.at)

**Familienberatungsstelle Pro Juventute**

Fischergasse 17, 5020 Salzburg

Tel.: 0662/43 13 55-42

E-Mail: [beratung.salzburg@projuventute.at](mailto:beratung.salzburg@projuventute.at)

[www.projuventute.at](http://www.projuventute.at)

**Verein V.I.E.L.E (für Frauen mit Zuwanderungshintergrund)**

Rainerstraße 27, 5020 Salzburg

Tel.: 0662/87 02 11

[www.verein-viele.at](http://www.verein-viele.at)

**Familienberatungsambulanz**

**Salzburger Universitätsklinikum (SALK)**

**Gynäkologische Ambulanz**

Müllner Hauptstraße 48, 5020 Salzburg

Tel.: 0662/4482-2509

[www.salk.at/6543.html](http://www.salk.at/6543.html)

**First Love Ambulanz**

**Salzburger Universitätsklinikum (SALK)**

**Gynäkologische Ambulanz**

Müllner Hauptstraße 48, 5020 Salzburg

0662/4482-2508

**First Love Ambulanz**

**Krankenhaus Zell am See**

Paracelsusstraße 8, 5700 Zell am See

[www.firstlove-salzburg.at](http://www.firstlove-salzburg.at)

## *Beratungsstellen in der Steiermark*

### **Frauengesundheitszentrum**

Joanneumring 3/1, 8010 Graz

Tel.: 0316/83 79 98

E-Mail: [frauen.gesundheit@fgz.co.at](mailto:frauen.gesundheit@fgz.co.at)

[www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at)

### **Beratungszentrum für Schwangere**

Nelkengasse 5,

stufenfreier Eingang Kaiserfeldgasse 27, 8010 Graz

Tel.: 0316/80 15 400

E-Mail: [schwangerenberatung@caritas-steiermark.at](mailto:schwangerenberatung@caritas-steiermark.at)

[www.schwangerenberatung.at](http://www.schwangerenberatung.at)

### **Frauenservice Graz**

Lendplatz 38, 8020 Graz

Tel.: 0316/71 60 22

E-Mail: [office@frauenservice.at](mailto:office@frauenservice.at)

[www.frauenservice.at](http://www.frauenservice.at)

### **Familienberatungsstelle LKH Feldbach**

Ottokar-Kernstockgasse 18, 8330 Feldbach

Tel.: 03152/899-3401

[www.baby-feldbach.at](http://www.baby-feldbach.at)

### **Familienberatungsstelle LKH Deutschlandsberg,**

**Geburtshilflich-Gynäkologische Abteilung im LKH**

Radlpaßstraße 29, 8530 Deutschlandsberg

Tel.: 03462/44 11-0



**Mafalda**

Arche Noah 11, 8020 Graz

Tel.: 0316/33 73 000

E-Mail: [office@mafalda.at](mailto:office@mafalda.at)

[www.mafalda.at](http://www.mafalda.at)

## *Beratungsstellen in Tirol*

### **AEP – Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft**

Müllerstraße 26, 6020 Innsbruck

Tel.: 0512/57 37 98

### **DOWAS für Frauen**

Adamgasse 4/2, 6020 Innsbruck

Tel.: 0512/56 24 77

### **Zentrum für Ehe- und Familienfragen**

Anichstraße 24/2, 6020 Innsbruck

Tel.: 0512/58 08 71

## *Beratungsstellen in Vorarlberg*

### **Ehe- und Familienzentrum**

Herrengasse 4, 6800 Feldkirch

Tel.: 05522/74 139

E-Mail: [efz@kath-kirche-vorarlberg.at](mailto:efz@kath-kirche-vorarlberg.at)

[www.efz.at](http://www.efz.at)

### **FEMAIL FrauenInformationszentrum Vorarlberg**

#### **Fachstelle Frauengesundheit**

Marktgasse 6, 6800 Feldkirch

Tel.: 05522/31 002

E-Mail: [gesundheit@femail.at](mailto:gesundheit@femail.at)

[www.femail.at](http://www.femail.at)

### **IfS-Beratungsstelle Bregenz**

St.-Anna-Straße 2, 6900 Bregenz

05574/42 890

### **schwanger.li**

Bahnhofstraße 18, 6800 Feldkirch

Tel.: 0810/00 33 44

E-Mail: [info@schwanger.li](mailto:info@schwanger.li)

[www.schwanger.li](http://www.schwanger.li)

## *Beratungsstellen in Wien*

### **Familienplanungsstelle im Sozialmedizinischem Zentrum Süd im Kaiser Franz Josef-Spital**

Kundratsstraße 3, 1100 Wien

Tel.: 01/60 191-4730

[www.wienkv.at/kav/kfj](http://www.wienkv.at/kav/kfj)

### **Familienplanungsstelle Hanusch Krankenhaus**

Heinrich Collin Straße 30, 1140 Wien

Tel.: 01/91 021-84 853

[www.oegf.at](http://www.oegf.at)

### **Familienplanungsstelle der Universitätsklinik für Frauenheilkunde**

Währinger Gürtel 18–20, Ebene 8/Leitstelle 8c, 1090 Wien

Tel.: 01/40 400-2851

[www.oegf.at](http://www.oegf.at)

### **Verein Lefö**

Kettenbrückengasse 15/2/4, 1050 Wien

Tel.: 01/ 581 18 80

E-Mail: [office@lefoe.at](mailto:office@lefoe.at)

[www.lefoe.at](http://www.lefoe.at)

### **Frauenberatungsstelle Lehargasse**

Lehargasse 9/2/17, 1060 Wien

Seitenstettengasse 5/7, 1010 Wien

Tel.: 01/58 76 750

E-Mail: [beratung@frauenberatenfrauen.at](mailto:beratung@frauenberatenfrauen.at)

[www.frauenberatenfrauen.at](http://www.frauenberatenfrauen.at)

**Familienplanungsstelle der Semmelweis Frauenklinik/  
Department KH Rudolfstiftung**  
Bastiengasse 36–38, 1180 Wien  
Tel.: 01/47 615-3901  
[www.oegf.at](http://www.oegf.at)

**Familienplanungsstelle im Gesundheitszentrum Wien Mitte**  
Strohgasse 28/2, 1030 Wien  
Tel.: 01/60 12 240 -336  
[www.oegf.at](http://www.oegf.at)

**first love Beratungsstelle für Jugendliche von 14 bis 18  
Rudolfstiftung**  
Juchgasse 25, 1030 Wien  
[www.firstlove.at](http://www.firstlove.at)

**first love Beratungsstelle für Jugendliche von 14 bis 18  
im Donauspital/ SMZ Ost**  
Langobardenstraße 122, 1220 Wien  
[www.firstlove.at](http://www.firstlove.at)

**first love Beratungsstelle für Jugendliche von 14 bis 18  
im Hanusch-Krankenhaus**  
Heinrich Collin-Straße 30, 1140 Wien  
[www.firstlove.at](http://www.firstlove.at)

# Wo werden Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?

---

Eine Liste mit Adressen aus ganz Österreich sowie Angaben zu notwendigen Unterlagen, (Zusatz-)Kosten, psychologischen (Nach-)Betreuungsangeboten, Öffnungs- und Wartezeiten finden Sie unter [www.fgz.co.at](http://www.fgz.co.at) sowie unter [www.doku.at](http://www.doku.at). Sie können sie auch in einem österreichischen Frauengesundheitszentrum (S. 36, 37) anfordern.

### *Kärnten*

#### **IR-Institut Dr.med.univ. Bernd Ellersdorfer**

Villacherstraße 1a/9, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0664/49 48 611

Methoden: Saugcurettage mit Vollnarkose

#### **Dr. Dietmar Pacher**

Ordination, Klagenfurterstraße 20/1, 9500 Villach

Tel.: 04242/222-23

Mobil: 0676/63 89 755

E-Mail: [dr.pacher@aon.at](mailto:dr.pacher@aon.at)

Methoden: medikamentöser Abbruch, Saugcurettage mit Vollnarkose

## *Oberösterreich*

### **AKH Linz**

Krankenhausstr. 9, 4021 Linz

Tel.: 0732/78 06-2227

<http://www.linz.at/akh/7732.asp>

Methode: medikamentöser Abbruch, Saugcurette mit Vollnarkose

## *Salzburg*

### **Gynmed Ambulanz am Salzburger Universitätsklinikum (SALK)**

Müllner Hauptstr. 48 (C1 Gebäude), 5020 Salzburg

Tel.: 0699/178 178 05

[www.gynmed.at](http://www.gynmed.at)

Methode: Medikamentöser Abbruch, Saugcurette mit Vollnarkose oder Lokalanästhesie

### **Institut für pränatalen Ultraschall - Dr. Dietmar Moosburger**

Neutorstraße 21, 5020 Salzburg

Tel.: 0676/91 34 934

E-Mail: [office@praenatal-diagnostik.at](mailto:office@praenatal-diagnostik.at)

[www.fetalschall.at](http://www.fetalschall.at)

Methode: Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch mit Mifegyne

## Steiermark

### **Dr.med.univ. Andreas Glasner**

Herrengasse 9, Generalihof, 2. Stock, 8010 Graz

Tel.: 0316/28 97 40

Mobil: 0664/12 05 242

E-Mail: dr.glasner@a1.net

www.dr-glasner.at

Method: Saugcurettage mit Vollnarkose

### **Dr. Walter Kobor**

Haydngasse 3, 8010 Graz

Tel.: 0316/82 68 26

E-Mail: kobor@gynaekologe.org

www.gynaekologe.org

Method: Saugcurettage mit Vollnarkose

### **Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

Auenbruggerplatz 14, 8036 Graz

Tel: 0316/385-12150

E-Mail: obgyn@medunigraz.at

www.klinikum-graz.at

Method: medikamentöser Abbruch, Saugcurettage mit Vollnarkose

### **LKH Voitsberg – Gynäkologische Tagesklinik**

Conrad von Hötzendorf-Str. 31, 8570 Voitsberg

Tel: 03142/20 12 283

www.lkh-voitsberg.at/cms/beitrag/10001348/2180570

Method: Saugcurettage mit Vollnarkose



**LKH Judenburg-Knittelfeld**

Oberweggasse 18, 8750 Judenburg

Tel: 03572/82 560-3246

[www.lkh-judenburg.at](http://www.lkh-judenburg.at)

Methode: medikamentöser Abbruch,  
Saugcurettage mit Vollnarkose

**LKH Deutschlandsberg**

Radlpassstraße 29, 8530 Deutschlandsberg

Tel: 03462/44 11-2401

[www.lkh-deutschlandsberg.at](http://www.lkh-deutschlandsberg.at)

Methode: medikamentöser Abbruch,  
Saugcurettage mit Vollnarkose

## *Tirol*

### **Dr. Hans Joachim Wolf**

Valiergasse 62, 6020 Innsbruck

Tel.: 0512/35 35 34

E-Mail: [praxis@drwolf.at](mailto:praxis@drwolf.at)

[www.drwolf.at](http://www.drwolf.at)

Methode: medikamentöser Abbruch, Saugcurette mit Vollnarkose

## *Vorarlberg*

### **Ärztehaus Montfort**

#### **Langzeitverhütung-Konfliktschwangerschaft**

Jahnstraße 20, 6900 Bregenz

Tel.: 05574/42 955

Mobil: 0676/93 17 845

E-Mail: [ememha@aerztehaus-montfort.eu](mailto:ememha@aerztehaus-montfort.eu)

[www.aerztehaus-montfort.eu](http://www.aerztehaus-montfort.eu)

Methode: medikamentöser Abbruch aus rechtlichen Gründen in zugehöriger Praxis in Lindau, Saugcurette mit Vollnarkose

## Wien

### **Krankenhaus Rudolfstiftung, Gynäkologische Ambulanz**

Juchgasse 25, 1030 Wien

Tel.: 01/71 16 47 41

[www.wienkav.at/kav/kar](http://www.wienkav.at/kav/kar)

Methode: Saugcurettage

### **Wilhelminenspital, Gynäkologische Ambulanz**

Montleartstraße 37, 1160 Wien

Tel.: 01/49 150-4710

[www.wienkav.at/kav/wil](http://www.wienkav.at/kav/wil)

Methode: Saugcurettage

### **Krankenanstalt Sanatorium Hera**

Löblichgasse 14, 1090 Wien

Tel.: 01/31 350-45 252

[www.hera.co.at](http://www.hera.co.at)

Methode: Saugcurettage mit Vollnarkose

### **Gynmed Ambulatorium für Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung**

Mariahilfergürtel 37, 1150 Wien

Tel.: 0699/178 178 00

[www.gynmed.at](http://www.gynmed.at)

Methode: Medikamentöser Abbruch, Saugcurettage mit Vollnarkose oder örtlicher Betäubung

**Pro:Woman Ambulatorium –  
Sexualmedizin und Schwangerenhilfe**

Fleischmarkt 26, 1010 Wien

Tel.: 01/51 29 631-250

[www.prowoman.at](http://www.prowoman.at)

Methode: Medikamentöser Abbruch, Saugcurettage mit Vollnarkose, örtlicher Betäubung oder Dämmerschlaf

**Sozialmedizinisches Zentrum Süd/Kaiser Franz Josef-Spital, Gynäkologische Ambulanz**

Kundratstraße 3, 1100 Wien

Tel.: 01/60 191-4730

Tel.: 01/60 191-47 36

[www.wienkav.at/kav/kfj](http://www.wienkav.at/kav/kfj)

Methode: Saugcurettage

**Semmelweis Frauenklinik, Department der Krankenanstalt Rudolfstiftung, Gynäkologische Ambulanz**

Bastiengasse 36–38, 1180 Wien

Tel.: 01/47 61 39 01

[www.wienkav.at/kav/sem](http://www.wienkav.at/kav/sem)

Methode: Saugcurettage

**Krankenhaus Hietzing mit neurologischem Zentrum Rosenhügel, Gynäkologische Ambulanz**

Wolkersbergenstraße 1, 1130 Wien

Tel.: 01/80 110-2793

[www.wienkav.at/kav/khr](http://www.wienkav.at/kav/khr)

Methode: medikamentöser Abbruch oder Saugcurettage

## *Niederösterreich*

### **Landeskrlinikum Korneuburg – Gynäkologische Ambulanz**

Wiener Ring 3-5, 2100 Korneuburg

Tel.: 02262/78 02 69, 02262/90 04 54 48

E-Mail: [office@korneuburg.lknoe.at](mailto:office@korneuburg.lknoe.at)

[www.korneuburg.lknoe.at](http://www.korneuburg.lknoe.at)

Methode: medikamentöser Abbruch,

Saugcurettage

### **Landeskrlinikum Wiener Neustadt – Gynäkologische Ambulanz**

Corvinusring 3-5, 2700 Wiener Neustadt

Tel.: 02622/90 04 24 52

E-Mail: [office@wienerneustadt.lknoe.at](mailto:office@wienerneustadt.lknoe.at)

[www.wienerneustadt.lknoe.at/](http://www.wienerneustadt.lknoe.at/)

Methode: Saugcurettage

### **Landeskrlinikum St.Pölten – Gynäkologische Ambulanz**

Probst-Führer-Straße 4, 3100 St. Pölten

Tel.: 02742/90 04 12 423

E-Mail: [office@stpoelten.lknoe.at](mailto:office@stpoelten.lknoe.at)

[www.stpoelten.lknoe.at](http://www.stpoelten.lknoe.at)

Methode: Saugcurettage

# Impressum

---

Herausgegeben vom Referat Frauen & Gleichstellung der Stadt  
Graz, Juli 2013, Online Ausgabe

Inhalt und Rechte:

Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren

Aktualisierung: Frauengesundheitszentrum, Graz, und das  
Netzwerk der österreichischen Frauengesundheitszentren

Recherche der Adressen in Tirol und Vorarlberg:

FEMAIL, Fraueninformationszentrum Vorarlberg e.V.

Lektorat und Grafik: Frauengesundheitszentrum, Graz

Medizinische Beratung: Univ.Prof.<sup>in</sup> Dr.<sup>in</sup> med. Éva Rásky

Juristische Beratung: Dr.<sup>in</sup> jur. Karin Prutsch

Aktualisierte und bearbeitete Neuauflage der Broschüre

**Ungewollt schwanger – Was nun?** des Netzwerkes der  
österreichischen Frauengesundheitszentren, 2002.